

《予防接種スケジュール》

ワクチンの種類	標準的な接種期間												接種方法
	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳6歳7歳7歳6ヵ月	
B型肝炎 (不活化ワクチン)	27日以上の間隔をおいて 2回接種				1回目の接種から139日以上の間隔をおいて 1回接種				1歳に至るまで				<ul style="list-style-type: none"> ・1歳に至るまでの間に3回接種。 ・27日以上の間隔をおいて2回接種。その後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種。
ロタウイルス (生ワクチン)	1価 (ロタリックス)		27日以上の間隔をおいて 2回同じワクチンで接種				初回(1回目)接種については、出生14週6日までに接種						<ul style="list-style-type: none"> ・生後6週0日後から24週0日後までの間で、27日以上の間隔をおいて2回接種。
	5価 (ロタテック)		27日以上の間隔をおいて 3回同じワクチンで接種				初回(1回目)接種については、出生14週6日までに接種						<ul style="list-style-type: none"> ・生後6週0日後から32週0日後までの間で、27日以上の間隔をおいて3回接種。
ヒブ (不活化ワクチン)	初回 生後2～7ヵ月に至るまでの間に開始し27日以上56日までの間隔をおいて3回接種。 ※3回目までの接種は1歳に至るまでに行う。				追加 前回の注射終了後、7ヵ月以上13ヵ月までの間隔をおいて1回接種				60ヵ月に至るまで				初回 ：1歳に至るまでに27日以上の間隔で3回接種。2回目・3回目の接種が1歳を超えてしまった場合はP8を参照。 ※接種開始時期によって回数は異なります。 追加 ：初回に係る最後の注射終了後7ヵ月以上の間隔をおいて1回接種。
小児用肺炎球菌 (不活化ワクチン)	初回 生後2～7ヵ月に至るまでの間に開始し27日以上56日までの間隔をおいて3回接種 ※3回目までの接種は1歳に至るまでに行う。				追加 生後12ヵ月以降、前回の注射終了後60日以上の間隔をおいて1回接種 (標準的には生後12ヵ月から15ヵ月)				60ヵ月に至るまで				初回 ：2歳に至るまでに27日以上の間隔で3回接種。2回目の接種が1歳を超えた場合はP9を参照。 ※接種開始時期によって回数は異なります。 追加 ：初回接種分終了後60日以上の間隔をおいて1回接種。
4種混合 { シフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ (不活化ワクチン)	1期初回 生後2ヵ月以降に開始し20日以上56日までの間隔をおいて3回接種(標準的には生後2ヵ月に達した時から生後12ヵ月に達するまで)				1期追加 1期初回3回目終了後12ヵ月に達した時から18ヵ月に達するまでに1回接種				90ヵ月に至るまで				1期初回 ：20日以上の間隔をおいて3回接種。 1期追加 ：初回3回目終了後6ヵ月以上の間隔をおいて1回接種。 2期 ：11歳以上13歳未満(標準的には小学校6年生)でシフテリア・破傷風の2種混合を1回接種。
BCG (生ワクチン)	生後5ヵ月に達した時から生後8ヵ月に達するまでに1回接種				1歳に至るまで				生後1歳に至るまでの間に1回接種。				
水痘 (生ワクチン)	生後12ヵ月～生後15ヵ月に至るまでに1回				1回目接種終了後6ヵ月～12ヵ月の間隔をおいて1回接種				36ヵ月に至るまで				<ul style="list-style-type: none"> ・生後12ヵ月～36ヵ月に至るまでの間に2回接種。 ・1回目接種後3ヵ月以上の間隔をおいて2回目接種。
麻しん・風しん混合 (生ワクチン)	1期 生後12～24ヵ月に至るまでの間に1回接種				2期 年長児で1回接種				1期：12～24ヵ月に至るまでに1回接種。 2期：年長児(5歳以上7歳未満で、かつ就学1年前から就学前日まで)に1回接種。				
日本脳炎 (不活化ワクチン)	1期初回 3歳に達した以降6日以上28日までの間隔で2回接種				1期追加 1期初回2回目接種終了後6ヵ月以上1年の間隔をおいて1回接種				90ヵ月に至るまで				1期初回 ：生後6ヵ月以降に開始し6日以上の間隔で2回接種。 1期追加 ：1期2回目終了後6ヵ月以上の間隔をおいて1回接種。 2期 ：9～13歳未満(標準的には小学校4年生)で1回接種。